

WEIDVOGELBESCHERMING

De Kiewiet

WWW.WVBDEKIEWIET.NL



JAARVERSLAG 2022

20 JAAR WEIDVOGELBESCHERMING IN WOUDENBERG-SCHERPENZEEL-RENSWOUD EN OMGEVING


Inhoud:

- ▶ Voorwoord en vooruitblik blz. 3
- ▶ Legsel beheer 2022 blz. 4, 5

- ▶ Tabellen 1 t/m 4 blz. 6, 7
- ▶ Grafiek & Kaartbeeld blz. 8

- ▶ Kievit kalender blz. 9
- ▶ Monitoring beheer 2022 blz. 10, 11
- ▶ Bijzondere broedsels & Weidevogeldrone blz. 12

- ▶ 1e eieren van het seizoen blz. 13
- ▶ **De adverteerders** blz. 14



Beschermingsgebied WVB 'De Kiewiet'

Scherpenzeel - december 2022

Oprichting : sinds 01-02-1998 als Weidevogelgroep WSR (Woudenberg-Scherpenzeel-Renswoude)
Stichting : sinds 20-11-2002 als Stichting Weidevogelbescherming "De Kiewiet"
Website : **www.wvbdekiewiet.nl**
Twitter : @wvbdekiewiet

Bestuur

Voorzitter	: Henk de Leeuw	☎ 06-4174 8078	✉ voorzitter@wvbdekiewiet.nl
Secretaris	: Gerrit van de Haar	☎ 06-1273 6466	✉ secretaris@wvbdekiewiet.nl
Penningmeester	: Edwin Hek	☎ 06-2505 6939	✉ penningmeester@wvbdekiewiet.nl
Bestuurslid	: Arjan Roobol	☎ 06-2660 6846	✉ arjan@wvbdekiewiet.nl

Coördinator - algemeen : Henk de Leeuw (weidevogel coördinator, voor algemene vragen)
Coördinator - natuurbeheer : Gerrit van de Haar & Henk de Leeuw (voor boeren met ANLb pakketten)
Coördinator - veldwerk : René Gerritsen (voor boeren & loonwerkers i.v.m. werkzaamheden in het veld)

Jaarverslag : **nummer 22**
Verslagmaker : Henk de Leeuw
Foto's in verslag : Vrijwilligers van weidevogelgroep 'De Kiewiet'
Oplage: : 150

Coverfoto: Kievitsvrouw beschermd haar jongen met klagende roep (foto HdL).

Voorwoord en vooruitblik:

Voor u ligt het jaarverslag 2022 met overzichten van alle telgegevens van de kievit en andere boerenlandvogels, zoals de scholekster, tureluur, grutto en zelfs een wulpenpaartje in de Gelderse Vallei.

Na een reeks jaren waarin extremen de boventoon voerden, kende ook weidevogelseizoen 2022 veel weersextremen. Het voorjaar startte na nattigheid en storm in februari met veel zon en droogte in maart. De maand april daarentegen begon met een korte periode met buien en wind. Na half april kruipen de



Kievit pul zoekend naar insecten!

eerste kievitskuikens uit hun eieren. De meeste insectensoorten hebben natte omstandigheden nodig, en juist hiervan moeten de kuikens gebruik maken.

Aanbod voedsel en zachte weersomstandigheden zijn dan van groot belang, want voedsel zoeken en schuilen tegen de kou gaat niet tegelijkertijd op.

Weidevogelbeschermers proberen samen met agrariërs en agrarisch collectieven steeds meer in te spelen op langdurige droogte door klimaatverandering. Ze pompen water op en proberen het water vast te houden. Het aanleggen van (greppel)plasdras is bijvoorbeeld een belangrijke maatregel om snel en effectief een voedselbiotoop te creëren.

Er spelen een aantal dossiers in de (agrarische) wereld, o.a. stikstof en klimaat. Onze weidevogels zoals de kievit, tureluur en grutto nemen een bijzondere positie in bij deze problematiek. Zij gedijen het beste in de weilanden en bouwlanden van boeren. Het zijn echte boerenlandvogels. Hier hoeft dus geen keuze te worden gemaakt tussen natuur en boeren. Habitatbehoud en -verbetering voor onze weidevogels blijft nodig. Is er in ons agrarisch landschap nog plaats voor weidevogels? Wij denken van wel!

De positieve resultaten van natuurinclusieve landbouw voor de weidevogels worden steeds duidelijker. Dit jaar hadden wij veel aandacht voor (greppel)plasdras gebieden. Enkele boeren hebben dit aangelegd.

Zelfs wij waren verrast over de aantrekkingskracht van een plasdras op allerlei vogels! Het was een groot succes. Vanaf 2023 start het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met daarbij de subsidies voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.

Hopelijk doen er volgende jaar nog meer boeren mee, zodat productie en natuur beter in balans komen. Onze weidevogels verdienen het en hopen we ze met aanvullende maatregelen te behouden voor de toekomst!



Slotavond 2022, agrariërs en vrijwilliger bij elkaar!

Tot slot. Onze stichting bestaat dit jaar 20 jaar! Wij willen onze vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun jarenlange inzet. Samen met de boeren hebben zij duizenden nesten gevonden en beschermd. Een prestatie waar wij trots op zijn.

Samenwerking sleutel tot succes!

Met gevleugelde groet,

Henk de Leeuw, voorzitter WVB 'De Kiewiet'

Legsel beheer 2022:

Het weidevogelseizoen begon dit jaar op **9 maart**, want op deze dag werd het **eerste kievitse** van Nederland in Hengevelde (prov. Overijssel) gevonden.

Het eerste kievitse in ons gebied werd op **17 maart** door Gerrit van de Haar in Renswoude gevonden. Deze vondst met één ei lag op een maisperceel waar het vanggewas nog redelijk kort was. Kieviten houden van een vrij uitzicht, en zullen altijd percelen uitkiezen met een lage gewasgroei of net bewerkte (mais)percelen. Voor overzicht van alle eerste eieren, zie bladzijde 13.

Het seizoen begon vrij nat tot zo half april, al snel daarna liep de gemiddelde temperatuur geleidelijk op en nam de droogte toe. Weidevogels hadden het moeilijk en zeker een soort als de kievit, wat een plevierensoort is, hadden het lastig. Kieviten leven graag in een open landschap, vrijwel uitsluitend in agrarisch gebied (graslanden en akkers) en broed graag in kort gras, afgewisseld met kale plekken.



Kievitslegsel hoog en droog (foto 7 april)

De weidevogelgroep is een stichting, die als doel heeft om weidevogels voor de Gelderse Vallei te behouden en bestaat uit een groep van 28 vrijwilligers. Inmiddels doen we op 61 agrarische bedrijven aan nestbescherming, waarvan op 10 bedrijven ook aan biotoopverbetering wordt gedaan. Dit laatste wordt verder toegelicht op blz. 10 en 11. Afgelopen seizoen hebben vrijwilligers op ruim 1100 HA beheerde gras- en bouwland totaal **335 weidevogel** legsels gelokaliseerd, waarvan 260 nesten als 'uitgekomen' werden vastgelegd. (zie tabellen op blz. 6/7).

Het algemene beeld van het broedsucces was redelijk. Uiteraard verschilt dit per gebied, en is mede afhankelijk hoe dit samenvalt met predatie, werkzaamheden, weersomstandigheden en de geschiktheid van het perceel, dit m.n. voor rondlopende pullen, wat nestvlieders zijn, wat betekend dat ze direct zelf naar voedsel moeten zoeken. Dit geldt echter niet voor scholeksters, daarvan worden de kuikens de eerste weken door beide ouders eerst nog gevoerd, hierdoor zien we ze ook terug op o.a. gebouwen.

Helaas blijkt uit meerdere onderzoeken dat alléén nestbescherming niet voldoende is om de weidevogels op peil te houden. Ook de vervolgfase 'kuikenoverleving' is van een groot belang, want na deze fase blijven de vliegvlugge exemplaren over, die het jaar daarop weer als broedvogel kunnen gaan broeden.



Bijna vliegvlug kievitsjong (± 4 weken oud)

Uitkomstpercentage van gemarkeerde legsels lag voor 2022 op 78,8%, wat goed is. Dit betekend dat 3 van de 4 legsels goed zijn uitgekomen. Maar zoals bekend begint dan de volgende zware taak voor de ouderlijke vogels, maar nu om hun kroost vliegvlug te krijgen.

Het algemene beeld van de weidevogels in de Gelderse Vallei blijft zorgelijk. Elk jaar worden er steeds te weinig vliegvlugge weidevogelkuikens groot gebracht om zodoende de populatie op peil te houden of zelfs te doen groeien. De Gelderse Vallei heeft enkele mooie kievit bolwerken in haar midden en juist op deze plekken werd afgelopen voorjaar veel broedende weidevogels gezien en later in mei-juni ook veel kuikens waargenomen.

Door veel intensieve landbouw blijven - in ons gebied - de aantallen grutto's, tureluurs, maar ook scholeksters op een zorgelijk aantal steken.



Volwassen tureluur met jongen in omgeving

Deze vogels gedijen beter in een open landschap voorzien van kruidenrijk grasland, extensieve beweiding en een hoger waterpeil.

De Gelderse Vallei heeft daar weinig plaats meer voor. Toch zijn er nog enkele locaties, waarbij meerdere Grutto's en Tureluurs voorkomen.

Op de foto hiernaast een tureluur met jongen in nabijheid. Tureluurs vertoeven het liefst nabij slootranden en plasdrassen i.v.m. bereikbaarheid van voedsel en voor schuilgelegenheid bij een dreigend gevaar.

Om aanwezige 'kritische weidevogels' extra ondersteuning te bieden kan vaak - tegen vergoeding - een 'Last minute' of Rustzone voor 'kritische weidevogels' worden afgesloten;

- Een 'Last minute' afspraak houdt in dat een deel of het hele perceel enkele weken van werkzaamheden wordt uitgesteld. Hier staat een reële compensatie vergoeding tegenover.
- Een rustzone voor 'kritische weidevogels' betekend 50m2 gras rondom het nest laten staan (7x7m.) en 50m2 gras laten staan langs de dichtstbijzijnde sloot (bijv. 1x 50mtr. of 2x 25mtr.) ten gunste van uitkomende weidevogellegels. Hier staat een vergoeding voor € 100,- per nest voor.

Afgelopen seizoen hebben 2 agrariërs daar gebruik van gemaakt. Zie hiervoor ook www.wvbdekiewiet.nl.

Predatie was ook dit seizoen weer aanwezig, maar acceptabel. Vossen die eieren uit een nest roven, een kraai of reiger die er met een jong kuiken vandoor gaat. Voor weidevogels hoort de dreiging van roofdieren bij het leven. Toch lijkt het er op dat de predatie onder weidevogels jaarlijks ligt toeneemt. Predatie is een complex probleem, maar kan ook niet los gezien worden van andere oorzaken van het verlies aan weidevogels.

Een van de oorzaken voor verhoogde predatie in de Gelderse Vallei is het verdwijnen van geschikt leefgebied door steeds intensiever gebruik van het boerenland. Maar met een wat meer gevarieerde leefomgeving neemt de predatiedruk onder weidevogels eerder af dan toe. Maar ook de doorzettende verdroging is voor weidevogels van negatieve invloed.



Foto's van wildcamera. Vlnr. das, vos en wilde/huiskat

De weidevogelgroep is al jaren in bezit van een wildcamera die, met goedkeuring van de agrariër, strategisch wordt neergezet om voorkomende predatoren in beeld te brengen. Helaas worden in het weidevogelseizoen ook steeds meer wilde/huis katten in het veld waargenomen.

Bovenstaande is mede de reden dat de weidevogelgroep, boeren, jagers (wbe) en agrarisch collectief zoveel mogelijk samenwerken om tot een succesvol weidevogelbeheer te komen. Blijkbaar is het nodig om eerst bewijs van aanwezige predatoren vast te leggen, om daarna gericht te kijken naar predatiebeheer wat binnen de huidige wetgeving valt.

Tabellen: Legsel resultaten

Aantal vrijwilligers/agrariërs per seizoen

over de laatste 5 jaar

<u>Naam:</u>	:	2018	2019	2020	2021	2022
Vrijwilligers	(actief) :	28	26	28	29	28
Agrariërs	(met legsels) :	54	63	60	61	61
Loonwerkbedrijven	:	12	12	13	13	13

Tabel 1

Totaal aantal Legsels per soort:

resultaten seizoen 2022

<u>Soort</u>	<u>Totaal</u>	<u>Bekend</u>	<u>Uit</u>	<u>Niet uit</u>	<u>% uit</u>	<u>Pred.</u>	<u>Bew.</u>	<u>Werk.</u>	<u>Verl.</u>	<u>Onb.</u>
Kievit	312	307	240	67	78.18	43	0	4	11	9
Kleine plevier	2	2	2	0	100.00	0	0	0	0	0
Scholekster	18	18	15	3	83.33	0	0	1	1	1
Tureluur	3	3	3	0	100.00	0	0	0	0	0
Totaal	335	330	260	70	78.79	43	0	5	12	10
% van bekend resultaat			78.8	21.2		13.0	0.0	1.5	3.7	3.0

Verklaring: Pred. = Predatie * (bijv. mens/kraai/vos)
 Bew. = Beweiding
 Werk. = Werkzaamheden
 Verl. = Verlaten
 Onb. = Onbekend

* Onder **predatie** wordt verstaan: het opeten van de eieren en/of jongen van weidevogels door dieren zoals kraaien, vossen, marterachtigen en roofvogels.

Voor uitsplitsing predatie, zie tabel 4 op blz. 7.

Tabel 2

Aantekening:

Ook dit jaar staan alle deelnemers, inclusief hun Legsels **niet** meer in het jaarverslag vermeld. Zijn op uw bedrijf legsels beschermd, dan zit deze - als losse bijlage - in dit verslag bijgevoegd.

Voor deelnemers met beheerpakketten kunnen de resultaten nogal afwijken, dit komt deels door Monitoring dan wel Legselbeheer buiten de rustperioden, deze staan nl. wel in Legselbeheer vermeld.

Voor vragen en opmerkingen bel of mail de weidevogel coördinator

Legsel resultaten per jaar en soort:

Over de laatste 8 jaren 'Legselbeheer'

<u>Soort</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Kievit	474	418	444	403	367	366	319	312
Scholekster	13	9	15	12	17	15	19	18
Tureluur	2	3	7	6	6	7	4	3
Grutto	2	3	3	3	2	2	0	0
Wilde eend	3	-	1	1	-	1	0	0
Gele kwikstaart	-	-	-	-	1	0	0	0
Kleine plevier	-	-	-	-	-	-	-	2
Totaal	494	433	470	425	393	391	342	335
Bekend resultaat	488	433	470	415	393	391	342	330
Uitgekomen nesten	313	320	368	340	328	303	265	260
Uitkomst in %	64.2	73.9	78.3	81.9	83.5	77.5	77.5	78.8

Tabel 3

Verliezen per soort:

'Legselbeheer'

<u>Soort</u>	<u>ON</u>	<u>P</u>	<u>PD</u>	<u>PK</u>	<u>PV</u>	<u>V</u>	<u>W</u>	<u>WB</u>	<u>WPE</u>	<u>Totaal</u>
Kievit	9	21	9	3	10	11	1	1	2	67
Scholekster	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3
Totaal	10	21	9	3	10	12	1	1	3	70
% van totaal	14.3	30.0	12.9	4.3	14.3	17.1	1.4	1.4	4.3	


Legenda:

ON: Onduidelijk welke oorzaak
P: Predatie soort niet bekend
PD: Predatie door Das
PK: Predatie door vogel (Kraai of meeuw)
PV: Predatie door Vos

V: Verlaten
W: Werkzaamheden soort niet bekend
WB: Werkzaamheden door Bemesten
WPE: Werkzaamheden Ploegen/Eggen


Tabel 4

Grafiek: Uitkomstresultaten Legsels



Grafiek

Kaartbeeld: Legsel resultaten



Kaartbeeld, met resultaat van alle 'legselbeheer nesten'

KIEVIT kalender



De kievit legt meestal 4 eieren in 4 à 5 dagen. De broedtijd duurt 26 dagen, waarna een kuiken vliegvlug is na 35-40 dagen. Elke fase heeft zijn belang en wordt hieronder toegelicht!

Totaal minimaal 65 dagen van eileg tot vliegend kuiken!

(Bron: factsheet Kievit van Vogelbescherming Nederland)

KALENDER

februari - maart

Aankomstfase



In zachte winters blijft een deel van de kieviten in Nederland, anderen trekken naar landen ten westen en zuiden van ons land en keren in het vroege voorjaar terug. Bij terugkomst zoeken ze vochtig grasland en akkers op.

maart - april

Vestigings- en nestfase



De kievitman komt eerst terug en vestigt zijn territorium, met imposante baltsvluchten. Kieviten gebruiken de strootjes uit strorijke vaste mest voor hun nest. Ook is vaste mest goed voor insecten en het bodemleven. Kieviten broeden liefst op vochtige graslanden met een korte (grazige) vegetatie. Ook broeden ze vaak op maispercelen; aangrenzende vochtige graslanden zijn dan nodig om voedsel te zoeken.

maart - april

Broedfase



De kievit legt 4 eieren in een ondiep kuiltje. Als een legsel mislukt, proberen ze het later vaak nogmaals. De eieren van het 1e legsel zijn groter en geven de jongen die eruit komen een grotere overlevingskans. Door het vroege broeden loopt het kievitsnest minder risico op (uit)maaien en vertrapping door vee. Wel zijn ze erg kwetsbaar voor bemesten, rollen en slepen (grasland) of ploegen en zaaibed maken (bouwland).

april - juni

Kuikenfase



Kuikens zijn in het veld te vinden tussen begin april tot eind juli; deze laatste kuikens zullen meestal afkomstig zijn van vervolglegels.

Kievitkuikens zijn nestvlinders: ze verlaten het nest snel om zelf voedsel te zoeken. Wel moeten ze (tot 20 dagen oud) bij kou opwarmen onder hun ouders. Ze zijn dan extra gevoelig voor verstoring. Bij voldoende voedsel en veiligheid blijven kievitkuikens zeer dicht bij de nestlocatie.

Een kievitkuiken eet 800-5000 prooidiertjes per dag: in graslanden vooral bodembewonende prooidieren zoals kleine insecten(larven), loopkevers of bovengrondse regenwormen.



Kievitkuikens foerageren bij voorkeur in korte, vochtige vegetaties met een graslengte van 1-5 cm. Kruidenrijke vegetatie in buurt is essentieel voor het bieden van beschutting en schuilmogelijkheden als er gevaar dreigt. Slikke plekken (zoals plas-drassen en afgevlakte slootranden, het liefst gecombineerd met een hoog waterpeil (0-20 cm beneden maaiveld)) en natte greppelranden zorgen voor betere overleving van kievitkuikens. Greppels zijn ook belangrijk om in weg te duiken. De overleving van kievitkuikens verbetert bij meer dan 150 meter greppel per hectare.

Ook houden kievitgezinnen van beweid grasland. Beweiding zorgt voor een afwisselende structuur van het gras waarin insecten beter te vinden zijn. Het is echter onbekend of de kuikens hierin ook voldoende groeien. Hetzelfde geldt voor kievitkuikens die foerageren op bouwland.

Kievitkuikens zijn vliegvlug na 35-40 dagen.



juni - augustus

Vorbereiding op de 'trek'



Na het broedseizoen verzamelen kieviten zich in groepen, inclusief de vliegvlugge jongen, en foerageren ze in vochtige graslanden. Hier eten ze onder andere emelten. De volwassen vogels ruien dan. De najaarstrek start vanaf september. Rond deze tijd arriveren ook kieviten uit de landen ten noordoosten van ons. Ze vormen gezamenlijke groepen die de vorstgrens zullen volgen.

Monitoring beheer 2022:

Afgelopen seizoen hebben tien agrariërs/grondgebruikers in ons beschermingsgebied weer deelgenomen om de kievit beter te beschermen. De maatregelen waren gericht op het verbeteren van de leefomgeving van de kievit en die maakte daar in de meeste gevallen ook gebruik van.

Beschikbare beheerpakketten, die gunstig zijn voor de weidevogels, m.n. bij ons voor de kievit zijn;

- **Plas-Dras** (P3)
- **Legselbeheer** – rustperiode op bouwland (P4)
- **Ruige mest** (P7)
- **Wintervoedselakker** (P15)
- **Kruidenrijke akkerranden** (P19)

Legselbeheer wordt vaak gecombineerd met een kruidenrijke akkerrand, dit i.v.m. foerageergebied.

Aanvullende informatie - incl. vergoedingen - zie Collectief Utrecht Oost www.collectiefutrechttoost.nl
Ook voor de nieuwe GLB-periode met de daarbij behorende agrarisch natuurbeheer start vanaf 1 januari. De beheervorschriften en -vergoedingen zijn grotendeels bekend en komen binnenkort op de website.



Deze droge sloot werd als 'greppelplasdras' ingezet, om zodoende het bodemleven voor de kievit te verbeteren.

Op 5 locatie werden 3 plasdrassen en 2 (greppel)plasdrassen in bedrijf gezet. Bij de deelnemende agrariërs worden de nesten in de rustperiode niet opgezocht, dit afhankelijk van het pakketsoort. Weidevogel vrijwilligers lopen eens in de 2 weken een monitoringsronde, waarbij alle voorkomende en waargenomen boerenlandvogels in kaart worden gebracht. Op deze manier worden alle aantallen individuele vogels, broedparen, legfels tot kuikens toe via de QBM methode in beeld gebracht.

QBM methode (Quickscan Beheer Monitoring) is een vrij grove telling waarmee de weidevogelvrijwilliger snel een beeld krijgt van de aanwezigheid van boerenlandvogels op de percelen, zodat daar - waar indien nodig - het beheer nog kan worden bijgestuurd. Dit gebeurt ook rondom de (greppel)plasdrassen die van toegevoegde aanvulling zijn op alle andere beheerpakketten en van belang zijn voor de algemene biodiversiteit, waaronder bij ons ook voor tientallen opgroeiende kievitspullen.



Afwisselend landschap geeft ruimte voor vogel en dier.

Rapportage van de hoofdsoorten 2022 van Weidevogelgroep 'De Kiewiet'.

- Totaal aantal Legsel- & Monitoring resultaten bij elkaar opgeteld -

Soort		Totalen			Nest status		
		Nesten (legselbeheer)	Broedparen (monitoring)	Totaal	Uitgekomen	Verloren	Onbekend
Kievit		239	104	343	240	67	5
Scholekster		18	0	18	15	3	0
Tureluur		3	0	3	3	0	0
Kleine Plevier		2	0	2	2	0	0
Grutto		0	1	1	0	1	0
Gele kwikstaart		0	4	4	1	0	3
Veld Leeuwerik		0	3	3	0	0	3
Wulp		0	1	1	0	1	0
Gekraagde Roodstaart		0	1	1	1	0	0
Kwartel		0	1	1	0	0	1
Totalen:		262	115	377	262	72	12

Tabel 5

Bovenstaande tabel, betreft alle **Legselbeheer nesten & Monitoring resultaten** bij elkaar opgeteld. Dit zijn dus nesten die zijn opgezocht en gemarkeerd om zo bij werkzaamheden te worden ontzien. Bij de monitoring zijn er veel mooie waarnemingen vastgelegd en waar mogelijk gefotografeerd.

De foto hieronder betreft een eerstejaars plasdras locatie, waarbij het hele voorjaar veel vogels zijn waargenomen zoals: Kievit, Tureluur, Scholekster, Kleine Plevier, Witte Kwikstaart, Oeverloper, Witgatje, Groenpootruiter, Krakeend, Bergeend, Boeren- en Huiszwaluw, Grote Zilverreiger en Lepelaar.

Voor weidevogels zijn waterlocaties zeer belangrijk. Naast aanwezigheid van voedsel is het ook met z'n alle veiliger vertoeven wanneer een rover nadert. Rondom de plasdras lagen ook meerdere legsel van verschillende vogels en werden (kievit)pullen veelvuldig tot vliegvlug toe waargenomen. Top locatie dus!




(Weide)vogels in en rondom plasdras aan de Laagerfseweg in Woudenberg.

Bijzondere broedsels:



< **Wulp:** vorig jaar hadden we al het vermoeden dat er in ons beschermgebied een wulp had gebroed, maar dat konden de vrijwilligers niet bevestigen. Dit jaar was dat wel het geval. Waarschijnlijk heeft de wulp gebroed in het natuurgebied 'Meeuwenkampje', wat deels van Staatsbosbeheer en deels van de Provincie Utrecht is. Daarna is het paartje met kroost het agrarisch gebied ingetrokken. Helaas zijn door maai- of schudwerkzaamheden de kuikens omgekomen, dit bij een agrariër waarbij geen beschermingswerkzaamheden werden uitgevoerd, omdat er geen weidevogelnesten lagen. Komend jaar gaan we dat wel doen!



< **Roodborsttapuit:** in het halfopen boerenland komen meerdere vogelsoorten voor. Deze zangvogel heeft geprofiteerd van een aanwezig gerstperceel, waar ook meerdere Gele Kwikstaart voorkomen. Het goed verborgen nest wordt op of net boven de grond gebouwd. Vanaf een uitkijkpost in het territorium, zie foto, wordt het grootste deel van het uit insecten en ander klein gedierte bestaande voedsel opgespoord. Het mannetje is goed herkenbaar met zwarte kop, witte halszijden en feloranje borst. In de winter verblijven deze vogels in zuidelijk deel Europa.



< **Kleine Plevier:** deze kleine wit met bruine vogels zijn goed te herkennen, hebben twee zwarte banden op hun kop en borst. De gele oogring steekt daar mooi tegen af. De uitgevlogen kuikens zijn wat doffer gekleurd en ook hun oogring is nog niet geel. Het zijn echt vogels van het binnenland en vertoeven het liefst op kale grond zonder planten. In ons gebied hebben minimaal 2 paar rondom een nieuw aangelegde plasdras gebroed. Beide hebben ook jongen gekregen die zijn uitgevlogen. Kleine plevieren lopen vaak op de rand van plas/dras en kunnen twee legsels per seizoen krijgen.

Weidevogeldrone

In het werkgebied van Collectief Utrecht Oost is voor het tweede jaar gewerkt met een Weidevogeldrone. Met het inzetten van deze drone met een warmtebeeld camera en slimme software kunnen vogelnesten en kuikens gemakkelijker en sneller gevonden worden. Weidevogelvrijwilligers worden hierbij met een stukje hoogwaardige technologie ondersteund, maar natuurlijk niet vervangen! Ook zorgt de drone voor minder verstoring. De dronepiloot ziet meteen wat er in het land ligt of loopt, zelfs van een paar honderd meter afstand.

Elk voorjaar wordt de drone ingezet om op een slimme en laagdrempelige manier inzicht te krijgen in de weidevogels. Zo helpen we onze agrariërs de nesten en kuikens te sparen. Vooral voor grote percelen is dit handig! Ook andere toepassingen zijn mogelijk, zoals het opsporen van reekalveren in lang gras.

De inzetbaarheid van de drone zal vnl. liggen in de periode van half april tot half juli. Dit vaak in de vroege ochtend, bij zonsopgang tot een uur of 8, dit heeft alles te maken met de buitentemperatuur om de warmtescanner van de drone goed te laten werken. De drone vliegt op ong. 40 meter en kan in één uur 30 hectare afvliegen. Kieviten verlaten vaak wel het nest, maar de eieren zijn door hun eigen warmte heel goed te traceren. Grutto en tureluur blijven vaak wel op hun nest zitten.



Afgelopen seizoen zijn op deze manier wederom legsels gelokaliseerd en geregistreerd. Bij Legselbeheer worden de nesten gemarkeerd, en bij de diverse kievitpakketten enkel geregistreerd. Voor het bijsturen van de beheerpakketten zijn deze gegevens van groot belang en kan in het najaar geëvalueerd worden.

1^e eieren van het seizoen

sinds oprichting bestuur d.d. 20-11-2002

De weidevogelgroep heeft twee ‘bokalen’ om de vindrs van het eerste kievitse en eerste scholekster ei in het zonnetje te zetten. Het is goed om agrariërs en vrijwilligers elk voorjaar weer te motiveren en gelijk aan nestbescherming te beginnen. Dit is belangrijk om onze weidevogels blijvend te beschermen en ze daarmee voor onze omgeving te behouden.

De band tussen agrariër en vrijwilliger is daarvoor essentieel.

De ‘wisselbokalen’ worden uitgereikt aan die agrariër of vrijwilliger die in het afgelopen seizoen als eerste een legsel van kievit of de scholekster heeft gevonden.

Voor het vinden van het eerste kievitse is voor vele jaarlijks een prachtige belevenis. Zoals bekend mogen geen kievitseieren meer worden geraapt, maar alleen nog worden beschermd!

Wisselbokaal 2022 is voor: Gerrit van de Haar



Overzicht 1 ^e gevonden eieren – per seizoen							
	KIEVIT			SCHOLEKSTER		Grutto	Tureluur
Jaar:	In Nederland	WVB De Kiewiet	Vinder	WVB De Kiewiet	Vinder	WVB De Kiewiet	WVB De Kiewiet
2002	7 maart	12 maart	Teus Valkenburg	25 april	-	5 april	1 mei
2003	11 maart	vogelpest	Teus Valkenburg	21 april	-	25 april	23 april
2004	14 maart	18 maart	Teus Valkenburg	20 april	-	13 april	20 april
2005	16 maart	21 maart	Teus Valkenburg	15 april	-	12 april	5 april
2006	18 maart	25 maart	Teus Valkenburg	22 april	Groep v.d. Peut	11 april	26 april
2007	7 maart	13 maart	Teus Valkenburg	13 april	René Gerritsen	11 april	18 mei
2008	3 maart	14 maart	Evert Steinmann	10 april	René Gerritsen	16 april	19 april
2009	8 maart	13 maart	Dik van Veldhuizen	16 april	Gert v.d. Peut	14 april	11 april
2010	16 maart	19 maart	Teus Valkenburg	20 april	Gert v.d. Peut	21 april	28 april
2011	6 maart	17 maart	Gerrit van de Haar	15 april	René Gerritsen	16 april	19 april
2012	10 maart	14 maart	Evert Steinmann	21 april	René Gerritsen	7 mei	3 mei
2013	21 maart	26 maart	Wijnand Osnabrugge	20 april	René Gerritsen & Edwin Hek	4 mei	7 mei
2014	5 maart	11 maart	Gerrit van de Haar	5 april	Evert Steinmann	20 april	5 april
2015	8 maart	11 maart	Dik van Veldhuizen	13 april	René Gerritsen & Edwin Hek	**	**
2016	9 maart	12 maart	René Gerritsen	12 april	René Gerritsen & Edwin Hek	15 april	**
2017	9 maart	13 maart	Gerrit van de Haar	14 april	René Gerritsen & Edwin Hek	15 april	21 april
2018	14 maart	23 maart	Gerrit van de Haar	18 april	René Gerritsen & Edwin Hek	5 mei	14 april
2019	28 febr.	16 maart	René Gerritsen	20 april	Edwin Hek	**	19 april
2020	2 maart	11 maart	Gijs van de Waardt	25 april	René Gerritsen	24 april	17 april
2021	5 maart	8 maart	Gijs van de Waardt	3 mei	H. Haanschoten	**	**
2022	9 maart	17 maart	Gerrit van de Haar	19 april	René Gerritsen	**	5 mei

* Officieel bijgehouden vanaf oprichting stichting d.d. 20-11-2002

** nest bezoek werd vermeden

Onze Sponsors



Loon & Grondverzetbedrijf

Schimmel B.V.

www.loonbedrijfschimmel.nl

Loon- en Grondverzetbedrijf Schimmel B.V

Brinkkanterweg 20 3925 BA Scherpenzeel gld
tel: 033-2773655 • fax: 033-2772887

KLUS- EN ONDERHOUDSBEDRIJF

JOB DE Leeuw



NIEUWBOUW EN VERBOUW

GLASHORST 25, 3925 BN SCHERPENZEEL

Tel. 033-2771291

Fax. 033-2770014

Mob. 06-53675538

E-mail: jobdeleeuw@zonnet.nl



METSELWERK

TEGELWERK

VOEGWERK

STUCWERK

TIMMERWERK



Midland Voeders

ForFarmers dealer

Midland Voeders

Tolboomweg 10 • 3784 XC Terschuur • T +31 (0)342 462 411

midland.voeders.vof@forfarmers.eu

Bedankt!